


# ĽUDSKÝ PAPILOMAVÍRUS (HPV)

V **5** ODPOVEDIACH




## 1

## ČO JE INFEKČIA ĽUDSKÝM PAPILOMAVÍRUSOM (HPV)?

Ľudský papilomavírus (HPV) je zodpovedný za najčastejšie sa vyskytujúcu pohlavne prenosnú infekciu na svete. HPV má v klasifikácii jednak nízkorizikové typy vírusu, ktoré spôsobujú genitálne bradavice, ale aj vysoko rizikové typy vírusu, ktoré dokážu spôsobiť rozvoj prekancerózných lézií a karcinómov vulvy, vagíny, krčka maternice a konečníka.

Do kontaktu s HPV sa dostane osem z desiatich pohlavne aktívnych žien. **Viac ako 80 % týchto infekcií sa spontánne vylieči v priebehu niekoľkých rokov.**

**Infekciu HPV si bežne pacientka nevšimne, pokiaľ nemá žiadne príznaky** a imunitný systém organizmu vírus nakoniec odstráni. V týchto prípadoch **infekcia nespôsobuje žiadne riziko.**



## 2

## AKO SOM SA INFIKOVALA ĽUDSKÝM PAPILOMAVÍRUSOM (HPV)?

Hlavný spôsob prenosu infekcie HPV je pohlavný styk (s vaginálnou či análnou penetráciou alebo aj bez nej). **Ktokoľvek, kto je pohlavne aktívny, sa môže infikovať vírusom HPV, dokonca aj v monogamnom pohlavnom vzťahu.**

**Použitie kondómu ochráni pred infekciou HPV v 70 % prípadoch.**

Po infikovaní **môže vírus zostať dlhší čas neaktívny**, čo znamená, že môže uniknúť detekcii aj roky po vzniku infekcie.

Po stanovení diagnózy HPV nie je možné určiť, kedy a od koho pacient infekciu dostal.



### 3

## AKO OVPLYVŇUJE MOJE ZDRAVIE?

**Väčšina ľudí sa počas života infikuje vírusom HPV, nemajú z toho však žiadne negatívne účinky ani žiadne príznaky.**

V 10 – 15 % prípadoch môže infekcia HPV pretrvávať bez toho, aby ju imunitný systém vášho organizmu eliminoval. **Pretrvávajúca infekcia HPV môže spôsobiť vznik lézií v bunkách, ktoré sa časom môžu rozvinúť do rakoviny.**

**Krčok maternice je oblasť pohlavných orgánov, ktorá je najviac ohrozená pretrvávajúcou infekciou HPV**, preto je aj náchylnejšia na rozvoj rakoviny.



Známe faktory z hľadiska pretrvávajúcej infekcie HPV a potenciálneho rozvoja do karcinómu krčka maternice sú:

- **Typ vírusu (niektoré typy HPV vírusov pretrvávajú dlhšie než iné)**
- **Fajčenie**
- **Nedostatočnosť imunitného systému**
- **Vysoký počet tehotenstiev**
- **Užívanie hormonálnej antikoncepcie veľmi dlhý čas**
- **Infekcia inými pohlavne prenosnými ochoreniami, predovšetkým chlamýdiami**
- **Veľký počet pohlavných vzťahov bez používania kondómu**
- **Nevyvážená vaginálna flóra**



**Rakovina krčka maternice je menej častá, ale závažná komplikácia, ktorá je dôsledkom bežnej a benígnej infekcie HPV.**

## 4

### DÁ SA LIEČIŤ?

**Na prevenciu infekcie existujú vakcíny, ktoré sú veľmi účinné z hľadiska ochrany pred hlavnými typmi HPV.** Vakcína sa vo všeobecnosti podáva dievčatám vo veku 9 až 14 rokov.

Ak vezmeme do úvahy, že pri vzniku 99 % prípadov rakoviny krčka maternice zohráva úlohu infekcia HPV, prevencia a liečba vírusom spôsobených lézií je nevyhnutná na zabránenie progresie do rakovinového ochorenia. Práve preto je **pravidelné vyšetrenie u gynekológa (PAP test, cytológia, cervikálny ster) nevyhnutné na identifikáciu prekancerózy.**

## 5

### ČO BY SOM MALA ROBIŤ ĎALEJ?

Patologický výsledok cytológie znamená, že môžete mať prekancerózu krčka a mali by ste absolvovať podrobnejšie vyšetrenie, aby sa toto podozrenie mohlo potvrdiť.

**Ak sa prítomnosť lézie potvrdí, budete potrebovať dôslednejšie sledovanie.** Užitočná bude aj lokálna liečba (vaginálny gél) s obsahom prírodných zložiek, ktoré pomáhajú zahojiť lézie a eliminovať vírus.

Ak nastane progresia lézie, môže byť potrebná chirurgická liečba na jej odstránenie.

**Ohľadne najvhodnejšieho postupu po stanovení diagnózy prekanceróznej lézie sa poraďte so svojim gynekológom.**

V rámci prevencie je nevyhnutná vhodná frekvencia gynekologických kontrol.

---

Pred použitím prípravku si v príbalovom letáku pozorne prečítajte poučenie o jeho správnom používaní.

Podrobnejšie informácie Vám poskytneme na adrese: Gedeon Richter Slovakia, s. r. o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava.  
tel.: 02/5020 5801, [www.richter.sk](http://www.richter.sk),  
e-mail: [richtergedeon@richter.sk](mailto:richtergedeon@richter.sk)



# PAPILOCARE®

## Vaginálny gél

Ak vám bola diagnostikovaná infekcia HPV, k dispozícii je nechirurgická liečba **vo forme vaginálneho gélu** (v kanylách s jednou dávkou) s dobrým bezpečnostným profilom<sup>1</sup>, **ktorá zlepšuje stav vaginálneho prostredia.**

Účinnosť **reepitelizačného a vyvažovacieho účinku na vaginálnu flóru** bola klinicky potvrdená z hľadiska prevencie a liečby lézií spôsobených HPV po 6 mesiacoch používania.



**Viac informácií o infekcií HPV, jej následkoch a liečbe získate od svojho gynekológa.**

1. Vigilance data on file. Procure Health SL 2018.



# PAPILOCARE®

Vaginálny gél

PRÍRODNÝ  
100 % BEZ HORMÓNŮV

## Reepitelizačný gél na prevenciu a podpornú liečbu lézií spôsobených ľudským papilomavírusom (HPV):

- Predchádzanie rizika vzniku cervikálnych lézií
- Reparácia cervikálnych lézií
- Obnovenie rovnováhy vaginálnej flóry
- Zlepšenie vaginálneho zdravia



Kanuly s jednou dávkou

### Návod na použitie:

Do vagíny vložte aplikátor s jednorazovou dávkou, podľa možnosti pred spaním. S liečbou začnite po menštruácii.



#### Prvý mesiac:

každý deň počas 21 za sebou nasledujúcich dní, následne vysadiť počas menštruácie, ak ju pacientka má



#### 2. až 6. mesiac:

každý druhý deň, následne vysadiť počas menštruácie, ak ju pacientka má